CÔNG TY CP DV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

TỜ HƯỚNG DẪN 1 TRANG · CHẤM BẢ GEL GIÁN ĐỨC, KIẾN HÔI & CẤM PHUN ĐÈ PYRETHROID

Tờ ép plastic cho tổ bếp đêm F&B 23h00–04h00 · Đồng bộ PCS-08, PCS-11, PCS-20 & HB-PCS-01

Mã hướng dẫn: WI-PCS-04
Phiên bản: v3.0 (19/11/2026)
Tham chiếu: PCS-08 & PCS-11
Định dạng: Ép A4 / Mang ca bếp

Mục tiêu xử lý	**Gián Đức** (trong tủ inox, bản lề, máy cà phê) · **Kiến hôi/Kiến lửa** (chống tách đàn)	Quy tắc bất di bất dịch	**KHÔNG phun Pyrethroid** đè hoặc gần (≤ 1 m) quanh điểm vừa chấm Gel

1. KỸ THUẬT CHẤM BẢ GEL GIÁN ĐỨC & PHÂN TÁCH XỬ LÝ GIÁN MỸ HỐ GA (CHUẨN BẾP F&B)

Thông số thao tác	Cách làm đúng ngoài bếp F&B / Quầy Bar	Lỗi hỏng mẻ bả (Tuyệt đối tránh)
Kích thước mỗi hạt Gel	Chấm điểm nhỏ gọn bằng **hạt đậu xanh (~0,1–0,2 g)** hoặc hạt gạo to ở góc khuất: bản lề tủ bếp, gầm bệ máy rửa chén, sau động cơ tủ mát, khe nẹp chân tường.	Bơm cả dây dài loang lổ vừa tốn thuốc, vừa nhanh đóng vảy cứng khiến gián chê không ăn, lại mất thẩm mỹ khi khách hàng kiểm.
Mật độ chấm thực tế	Mức nhẹ: **1–2 điểm/m²** · Mức nặng thấy cả gián con & ổ trứng: **3–5 điểm/m²** tập trung ngay sát vết phân đen li ti giống bã cà phê trong khe ẩm.	Chấm ra giữa mặt bàn thớt, sát miệng vòi xịt nước hoặc chỗ thợ tạp vụ lau xả phòng hằng đêm làm trôi sạch Gel.
Tách riêng gián Mỹ cống	**Gián Mỹ** (con to nâu đỏ) đi lên từ cống ngầm -> Rà tồn lưu **Perme UK 50EC** (5 mL/L) hoặc **Cypado 25EC** (20 mL/L) thẳng xuống nắp hố ga/bẫy mỡ ngoài trời.	Phun hơi sương **EC** mù mịt ngay trên gầm tủ inox có đặt Gel -> Mùi xua đuổi làm gián Đức bỏ bả chạy tán loạn vào phòng lạnh.
Làm sạch & luân vòng Gel	Chỉ chấm bả **SAU KHI** tạp vụ bếp đã rửa dầu mỡ, xịt khô sàn và không còn hơi hóa chất tẩy rửa. Nếu 2 chu kỳ gián giảm chậm, đổi ngay dòng hoạt chất Gel khác.	Chấm Gel đè lên bề mặt đang ướt dầu mỡ rán hoặc đang bốc mùi Javel nặng khiến gián không nhận diện được mồi ngọt.

2. KỸ THUẬT ĐẶT BẢ KIẾN CHỐNG TÁCH ĐÀN & NGUYÊN TẮC CẤM PHUN ĐÈ LÊN ĐIỂM BẢ

Tình huống kiến	Thao tác đúng để diệt tận kiến chúa trong tổ	Vì sao CẤM phun xua đuổi trực tiếp?
Kiến leo đường dài trên tường / bếp	Dùng đèn pin soi theo hàng kiến đi kiếm mồi để xác định đường trục chính -> Chấm **nhiều giọt bả Gel/si-rô ngọt (hoặc đạm)** sát dọc hàng kiến (cách mép hàng 1–2 cm).	Phun bình xịt ngay lên hàng kiến làm kiến thợ chết tại chỗ nhưng **kiến chúa ở dưới nền chia làm 3–5 tổ mới** bò sang phòng khác (hiện tượng tách đàn).
Thời gian chờ kiến tha mồi về tổ	Để yên hoàn toàn **48–72 giờ** cho kiến thợ tha mồi mang chất chậm tác dụng về nuôi kiến chúa và ấu trùng trong tổ; tuyệt đối không lấy khăn ướt lau sạch giọt bả giữa chừng.	Khách hoặc tạp vụ lau mất giọt bả mới đặt sau vài giờ khiến tổ chưa đủ liều chết, 1 tuần sau đàn kiến lại bò ra đông hơn.
Kiến lửa ngoài sân vườn / bồn hoa	Chỉ rải hạt hoặc phun dập thấm sâu trực tiếp vào miệng tổ đất ngoài vườn sau khi đã xử lý hàng kiến đi vào hành lang nhà bằng bả truyền nhiễm.	Xử lý thiếu đồng bộ giữa ngoài vườn và trong nhà làm kiến chạy dồn ngược vào ổ điện hoặc gầm tủ quần áo tầng 1.

LỆNH CẤM TUYỆT ĐỐI TẠI CA ĐÊM F&B: Trong cùng một khu bếp, không bao giờ để một người đi chấm Gel gián/kiến phía trong còn người kia vác bình phun Pyrethroid (Fendona, Permecide, Perme UK...) đi rà dọc chân tủ ngay sau lưng. Giữ khoảng cách **≥ 1 m** giữa điểm bả Gel và khu vực rà tồn lưu chân tường/cửa thoát hiểm.

ĐỐI SOÁT KHU BẾP TRƯỚC KHI CHẤM GEL	KIẾN NGHỊ KẾT CẤU BẾP GỬI BÊN A
Tạp vụ bếp đã lau khô dầu mỡ và che kín gia vị/máy móc trước ca. Tổng số điểm đặt Gel mới / thay Gel cũ: ..... điểm.	Đề xuất xử lý ron gạch hở, nạo vệ sinh bẫy mỡ & giữ khô chân tủ. KTV ca đêm ký: .....